

LISTE DES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES POUVANT ETRE DEPISTEES CHEZ LA FEMME ET L'HOMME PARTENAIRE DE LA FEMME

Infection par le Virus de l'immunodéficience humaine (VIH)

Infection par le Virus de l'hépatite B (VHB)

Infection par le Virus de l'hépatite C (VHC)

Syphilis

LISTE DES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES POUVANT ETRE DEPISTEEES ET TRAITEES (TRAITEMENT DE PREMIERE INTENTION)

CHEZ LA FEMME ET L'HOMME PARTENAIRE DE LA FEMME

Infections sexuellement transmissibles	Condition de réalisation du dépistage
Infection à Chlamydia trachomatis	Femme asymptomatique ou présentant une symptomatologie d'infection génito-urinaire basse
	Homme asymptomatique
Infection à Neisseria gonorrhoeae	Femme asymptomatique ou présentant une symptomatologie d'infection génito-urinaire basse
	Homme asymptomatique

LISTE DES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES POUVANT ETRE TRAITEES (TRAITEMENT DE PREMIERE INTENTION) CHEZ LA FEMME ET L'HOMME PARTENAIRE DE LA FEMME

Infections sexuellement transmissibles	Condition de réalisation du traitement
Trichomonas vaginalis	Femme asymptomatique ou présentant une symptomatologie d'infection génitale basse
	Homme asymptomatique partenaire d'une patiente ayant une infection à ce germe
Infection à Herpès génital	Femme avec une symptomatologie génitale et en prévention des récurrences

LISTE DES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES POUVANT ETRE DEPISTEEES CHEZ L'HOMME PARTENAIRE DE LA FEMME

AVEC ORIENTATION IMMEDIATE VERS UN MEDECIN OU UN SERVICE SPECIALISE

Infections sexuellement transmissibles	Condition de réalisation du dépistage
Infection à Chlamydia trachomatis	Homme présentant une symptomatologie d'infection génito-urinaire basse
Infection à Neisseria gonorrhoeae	Homme présentant une symptomatologie d'infection génito-urinaire basse

**Le dépistage des infections à papillomavirus humains (HPV)
peut être réalisé par les sages-femmes pour leurs patientes suivant les recommandations en vigueur.**